ПАМЯТКА ПОСЛЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ УСЛОВНО СЪЁМНЫМИ, СЪЁМНЫМИ И КОМБИНИРОВАННЫМИ ПРОТЕЗАМИ

Уважаемый пациент!

Целью оказания медицинских услуг является сохранение, продление, повышение качества Вашей жизни, восстановление, улучшение, поддержание Вашего здоровья. Достижение данной цели зависит не только от действий врача и других работников клиники, но и от встречных с Вашей стороны действий, направленных на содействие в оказании качественной медицинской услуги, как это предписано Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг» и Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Клиника «КРЕМЛЁВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» уведомляет Вас, что тщательное соблюдение данных рекомендаций очень важно и является обязательным условием обеспечения высокой вероятности положительного результата проведенного лечения, безопасного пользования результатами оказанной медицинской услуги, отсутствия осложнений.

ВАМ СЛЕДУЕТ:

Не принимать пищу в течение 2 (___) часов после окончания процедуры. Принимайте пищу только по окончании действия анестезии во избежание прикусывания губ и щек.

Правильно и эффективно ухаживать за зубами, полостью рта в целом с использованием всего арсенала современных средств гигиены полости рта (см. Рекомендации по индивидуальной гигиене полости рта). Рекомендовано применение ирригатора, особенно в случае условно съемного протезирования. Перед использованием следует внимательно прочесть инструкцию по применению.

Съемные Протезы необходимо чистить зубной щеткой с порошком или зубной пастой (в настоящее время выпускаются специальные пасты для чистки протезов) в проточной воде комнатной температуры до и после еды. Нельзя мыть протезы в горячей воде, так как от этого они деформируются и становятся негодными (не соответствующими протезному ложу).

Первое время, пока не наступило привыкание к протезу, им следует пользоваться круглосуточно. Когда протез перестает замечаться, на ночь его можно извлечь (по желанию) и, вычистив зубной щеткой, положить в сухую закрывающуюся коробку. Утром протез снова необходимо вычистить в проточной воде и наложить

При использовании фиксирующих кремов и порошков следует внимательно прочесть и следовать прилагаемой инструкции.

Тщательно выполнять все назначения врача как указанные в настоящей рекомендации, так и данные Вам любым иным способом.

При появлении после завершения процедуры боли, припухлости, чувства жжения или иного дискомфорта в полости рта, а так же в случае общего недомогания следует обратиться в клинику «КРЕМЛЁВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» для дополнительного обследования и консультации с врачами-специалистами в целях исключения осложнений и проведения, при необходимости, лечения.

Не следует рассчитывать на мгновенное привыкание к протезу. Практически все вышеуказанные виды протезов нуждаются в дополнительной коррекции после их наложения. Обычно для таких коррекций требуется не менее 3-4 посещений.

Не реже одного раза в шесть месяцев являться на профилактические осмотры, начиная с дня оказания медицинского вмешательства или в соответствии с иными согласованными датами. В случае **условно съемного протезирования** контрольные осмотры должны проходиться **не реже одного раза в ТРИ месяца.**

Следует ограничить употребление чрезмерно твердой пищи: скорлупы орехов, твердые кости и подобное, а так же не рекомендуется грызть семечки и перекусывать зубами нитки.

Важным аспектом предупреждения осложнений лечения является целостность, герметичность ортопедических конструкций, поэтому следует немедленно обратиться в клинику в случае обнаружения отколов или трещин или переломов установленных протезов. В подавляющем большинстве случаев съемные протезы подлежат починке.

Клиника «КРЕМЛЁВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ» желает Вам успехов и крепкого здоровья!